

Петровакс

Имофераза®

Крем для специализированного ухода за кожей в области шрама, рубца

Компания ООО «НПО Петровакс Фарм», производитель оригинальных лекарственных препаратов, разработала высокоэффективное косметическое средство для специализированного ухода за кожей в области шрамов, рубцов.

Активная молекула крема Имофераза®

В состав крема входит фермент гиалуронидаза. Благодаря применению инновационных технологий, ученым ООО «НПО Петровакс Фарм» удалось стабилизировать фермент, который теперь обладает комплексным действием и длительным эффектом. Стабилизированная гиалуронидаза подавляет образование избыточной соединительной ткани, снижает отечность в области шрама, рубца.

Когда применять:

При любом повреждении кожи, полученном в результате травмы, операции, ожога, косметологической процедуры, а также после угревой сыпи (постакне) может сформироваться шрам, рубец. Применение крема Имофераза® в течение 4-8 недель поможет снизить вероятность появления грубого рубца после эпителизации кожи и сделать уже сформированный шрам и постакне менее заметными.

Эффекты применения крема при сформированных шрамах, рубцах и после эпителизации кожи:

- Восстановление защитно-барьерных функций кожи в зоне шрама, рубца
- Уменьшение покраснения и гиперпигментации
- Снижение неприятных ощущений: стянутости, сухости, зуда, жжения
- Повышение эластичности рубцовой ткани
- Уменьшение вероятности образования грубого рубца после заживления (эпителизации) раны

В случае уже сформированного шрама применение крема поможет сделать его менее заметным!

Рекомендации по применению крема при сформированных шрамах или для их предупреждения:

- Наносите крем тонким слоем на чистую кожу легкими массирующими движениями 2 раза в день
- Продолжительность применения 4-8 недель. При необходимости возможно более длительное использование крема
- Крем следует использовать после полной эпителизации (заживления) кожи (обычно не ранее 2-3 недель после повреждения)

Первые результаты применения крема заметны уже через 4 недели использования.²



Важно регулярное применение крема Имофераза® для достижения наилучшего результата!

Эффекты применения крема при проблеме постакне (последствиях угревой сыпи):

- Улучшение внешнего вида кожи проблемных областей
- Уменьшение покраснения и гиперпигментации
- Разглаживание рельефа
- Уменьшение натяжения кожи

При тяжелых формах проявления постакне используют комбинацию лазерного воздействия и дальнейший уход кремом Имофераза®.¹

Рекомендации по применению крема при постакне (последствиях угревой сыпи):

1. Очистите кожу Вашим привычным средством.
2. Протрите кожу тоником, если Вы им пользуетесь.
3. Нанесите крем Имофераза® точно на следы от акне: покраснения, неровности.
4. Через 3 минуты нанесите крем для ежедневного использования или тональное средство.

Не наносите на воспаленные участки!

Безопасность и удобство применения:

- Крем прошел строгий дерматологический контроль, не оказывает кожно-раздражающего и аллергизирующего действия³
- Не содержит парабенов и отдушек
- Не требует специальной подготовки кожи перед использованием
- Быстро впитывается
- Не оставляет следов на одежде

Объективная оценка состояния кожи в области гипертрофического рубца после применения крема Имофераза® продемонстрировала:⁴



Уменьшение высоты шрама, рубца (в среднем в 2,1 раза)



Уменьшение уровня интенсивности окраски шрама, рубца



Увеличение эластичности шрама, рубца



Повышение увлажненности кожи в области шрама, рубца

Через 8 недель применения крема Имофераза® отмечено улучшение внешнего вида рубца.⁴

Часто задаваемые вопросы:

? Что такое постакне?

Постакне – это косметический дефект кожи, который является последствием угревых высыпаний (акне). Наиболее частыми

проявлениями постакне являются покраснения, нарушения пигментации, рубцы.

? Через какое время можно начинать применять крем после снятия операционных швов? Что можно сделать, чтобы след от оперативного вмешательства был менее заметным?

Следуйте рекомендациям доктора для предотвращения инфицирования и травмирования области послеоперационной раны. А после полной эпителизации (заживления) начинайте применение крема Имофераза® для уменьшения вероятности образования грубого шрама, рубца, уменьшения покраснения и ощущения стянутости и дискомфорта – сухости и зуда после снятия операционных швов.

? Поможет ли крем Имофераза® при возвышающемся шраме после старой травмы?

Активный фермент, содержащийся в креме, воздействует на структуру рубцовой ткани, независимо от срока ее существования. Крем помогает сократить толщину и высоту рубцовой ткани, уменьшить ощущение стянутости, шелушения и зуда при соблюдении рекомендаций по применению.

? Можно ли наносить крем чаще для большей эффективности?

В этом нет никакой необходимости. Стабилизация фермента обеспечивает его высокую активность и пролонгированное действие, поэтому крем достаточно наносить всего 2 раза в день.

? Требуется ли специальные условия применения крема при уходе за шрамами? Возможно, нужно накладывать повязку или пластырь на область нанесения средства?

Крем очень удобен в применении, он быстро впитывается, не требует предварительной подготовки кожи и дополнительных условий использования.

Имофераза®

Состав (INCI):

Aqua, Glyceryl monostearate, Cetylstearyl alcohol, Ceteareth-23, Ceteareth-6, Hyaluronidase immobilized, Sodium benzoate, Sodium chloride.

Особые указания:

Крем только для наружного применения. Во избежание нежелательных явлений не применять у лиц с заведомо известной чувствительностью к компонентам крема.

Условия хранения:

Хранить в холодильнике при температуре 2-8 °С, не замораживать. После начала использования хранить крем не более 6 месяцев. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

24 месяца.

Изготовитель и организация, принимающая претензии:

ООО «НПО Петровакс Фарм»
Юридический адрес:
Российская Федерация, 142143,
Московская обл., г. Подольск,
с. Покров, ул. Сосновая, д. 1,
тел.: +7 (495) 926-21-07, +7 (495) 730-75-45
www.petrovax.ru, www.imoferaza.ru
e-mail: adr@petrovax.ru

¹ По данным клинической апробации эффективности и безопасности применения крема Имофераза® в уходе за кожей пациентов с клинической картиной постакне АО «Институт пластической хирургии и косметологии», г. Москва, 2017

² Статья «Эффективность крема, содержащего стабилизированную гиалуронидазу, для коррекции рубцовых изменений кожи» Перламутров Ю.Н., Ольховская К.Б., Consilium Medicum, Дерматология (Прил.), г. Москва, 2017

³ По данным клинической апробации по оценке кожно-раздражающего и аллергизирующего действия крема Имофераза® ООО «НПЦ «КосмоПродТест», г. Москва, 2016

⁴ По данным отчета о результатах добровольной клинической апробации средства косметического – Крем косметический Имофераза® ООО «НПЦ «КосмоПродТест», г. Москва, 2016

